

Le raton laveur

Bien qu'ils soient incroyablement mignons, les ratons-laveurs sont une espèce très envahissante. En Wallonie, la population a été évaluée en juillet 2024 entre 50 000 et 75 000 individus. En Flandre, les chiffres ne sont pour le moment pas connus mais on sait qu'ils se déploient également largement sur le territoire. Et tout cela, en seulement quelques années. Le petit mammifère originaire d'Amérique du Nord est aujourd'hui déclaré comme une espèce invasive par le Conseil de l'Europe.



Le **raton laveur commun** est un **mammifère carnivore, omnivore** de la famille des **procyonidés**.

Originaire d'Amérique du Nord, l'espèce vit également en Europe, au Moyen Orient et au Japon suite à l'introduction faite par l'homme.

CLASSIFICATION

- Règne : Animal
- Embranchement : Chordé vertébré
- Classe : Mammifère placentaire
- Ordre : Carnivore caniforme
- Famille : Procyonidé procyoniné
- Genre : Procyon
- Espèce : lotor
- Nom latin : Procyon lotor





COATI



KINKAJOU

PROCYONIDES



PANDA ROUX

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU RATON LAVEUR

TAILLE :

40 à 80 cm

CARACTÉRISTIQUE DU CORPS :

Museau pointu, **longues griffes non rétractiles**, queue longue

POIDS :

4 à 9 kg

LONGUEUR DE LA QUEUE :

20 à 30 cm

COULEUR DU PELAGE / FOURRURE :

Gris-brun ; poivre et sel ; tête blanche avec des taches noires ; **fourrure dense**

CRIS / BRUIT :

Le grognement ; **le raton laveur grogne**

Cri du raton laveur

Le raton laveur peut être confondu avec d'autres animaux, en particulier avec le chien viverrin (ou tanuki). Mais ce dernier étant un canidé, ne dispose pas de membres antérieurs lui permettant de saisir des objets. Par ailleurs, son aspect est plus trapu, son masque facial est généralement interrompu sur le museau, sa queue est d'un aspect arrondie et unie et son pelage, tournant davantage vers un aspect brunâtre est plus difficile à confondre en été.



HABITAT ET ALIMENTATION DU RATON LAVEUR

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE :

Amérique du Nord, Amérique Centrale, Mexique, Europe, Moyen Orient, Japon

LIEU DE VIE :

Le raton laveur vit dans les forêts, à proximité des cours d'eau et des marécages.

Animal très adaptable, on le retrouve autour des terres agricoles et des zones péri urbaines.

RÉGIME ALIMENTAIRE :

Omnivore à prédominance **carnivore**

TYPE DE NOURRITURE :

Il mange des grenouilles, des poissons, des tortues, des **rongeurs**, des insectes, des vers, des larves.

Il lui arrive de manger des charognes.

L'un des termes qui lui est le plus souvent associé est celui d'opportuniste. Il est omnivore et son alimentation peut varier selon les régions. Il consomme beaucoup de fruits comme des raisins, des cerises, des pommes, des glands, des racines ou encore des noix. Cependant son régime alimentaire est habituellement en bonne partie carnivore. Le raton laveur se nourrit alors d'écrevisses, d'insectes, de rongeurs, de grenouilles, de poissons et d'œufs d'oiseaux. Dans l'ensemble, il consomme plus d'invertébrés que de vertébrés. L'animal est aussi connu pour faire les poubelles.

Le raton laveur est un animal solitaire. L'animal est un excellent grimpeur et passe beaucoup de temps dans les arbres. Il est également un bon nageur.

Le raton laveur passe l'hiver en état de dormance et son métabolisme se ralentit. Afin de faire face à cette période, il emmagasine de grandes réserves de graisse en été et peut ainsi doubler son poids.

Peu farouche, le raton laveur n'hésite pas à s'aventurer à proximité des habitations humaines et parfois même à installer son terrier dans des granges ou des greniers.

Territoire :

1 à 50 km² en fonction de la quantité de nourriture disponible

Nom du mâle : Le raton

Nom de la femelle : La ratonne

Nom du bébé / petit : Le ratonneau

La période de reproduction s'étend de février à juin. Le raton laveur mâle est polygame, il va féconder plusieurs femelles successivement.

La femelle, elle, est monogame. Après l'accouplement, elle va repousser tous les autres prétendants.

La gestation dure de 63 à 65 jours et ils ont de 3 à 4 ratons par année (en moyenne 4). Le poids du nouveau-né est de 80 g. Ils sont sevrés après 70 jours.



La femelle va s'occuper toute seule des petits.

Ils vont chercher leur nourriture ensemble la nuit et partager la même tanière le jour.

La mère va leur apprendre à grimper, à chasser et à nager quelques mois après leur naissance.

La cellule familiale va se dissoudre à l'arrivée de la prochaine portée.

La maturité sexuelle de la femelle a lieu avant l'âge d'un an et celle du mâle est atteinte vers deux ans.



L'homme est le principal prédateur du petit mammifère.

En Amérique du Nord, il est toujours chassé pour sa fourrure. La valeur de son pelage est élevée, jusqu'à quatre millions d'individus sont chassés et tués chaque années. Beaucoup d'entre eux sont également victimes des automobilistes.

En Europe, cette espèce exogène est considérée comme invasive. Il est particulièrement redouté par les agriculteurs car il peut causer des dommages importants aux cultures de maïs ou encore dans les vergers, les vignobles, les basses-cours... Il peut aussi créer des dégâts dans des nids.

Aujourd'hui, le raton laveur se rapproche de plus en plus des villes. Il peut aussi détruire des garages, des potagers, des pelouses ou encore des toitures.

Réservoir de maladies:

Le raton laveur est aussi reconnu comme un réservoir potentiel de maladies pouvant être transmises à l'homme (zoonoses), incluant différents virus, des bactéries et des vers parasites. Du fait de sa tendance à fréquenter les hommes, il présente un risque sanitaire plus important que d'autres animaux exotiques installés en Wallonie.

La transmission d'agents pathogènes peut s'effectuer par le biais de la consommation de fruits ou de légumes souillés par de l'urine ou par des excréments ainsi que par contact direct avec les animaux.

Quelles maladies peuvent être transmises par le raton laveur ?

La baylisascariose


Pathologie causée par un ver parasite du raton laveur, *Baylisascaris procyonis*, transmis par l'ingestion d'œufs excrétés dans les matières fécales.

Rarement, la baylisascariose peut être transmise à l'homme, en particulier chez les jeunes enfants qui sont les plus susceptibles d'ingérer de la terre.

Les signes cliniques chez l'homme incluent une encéphalite (parfois mortelle) et des troubles oculaires.

Ce vers intestinal a été officiellement détecté en Wallonie sur 6 ratons laveurs en juillet 2024.





La baylisascariose

Un hôte paraténique est un hôte facultatif et surnuméraire, comme des poissons ou des grenouilles, qui héberge la forme larvaire d'un parasite sans qu'il y ait de développement ou de multiplication de ce dernier. Ce type d'hôte agit comme un réservoir de parasites en attendant que celui-ci soit ingéré par l'hôte définitif, rendant la transmission du parasite plus probable et aidant à combler un vide trophique dans son cycle de vie.

Caractéristiques:

Facultatif : l'hôte paraténique n'est pas indispensable au cycle de vie du parasite.

Pas de développement : le parasite ne se développe pas ni ne se multiplie chez cet hôte, restant généralement sous forme enkystée.

Hôte de transport : il sert de maillon de transport, facilitant la dispersion et l'accumulation du parasite.

Ingéré par l'hôte définitif : l'hôte paraténique transmet le parasite à l'hôte définitif lorsque ce dernier l'ingère.

La rage

La rage est causée par un virus, le Lyssavirus, dont il existe plusieurs formes, presque toutes transmissibles à l'homme par la salive (lors d'une morsure, d'une griffure ou d'un léchage notamment).

Les rages du renard et du chien ont été éliminées de Belgique depuis le début des années 2000 grâce à des campagnes de vaccination. Toutefois, le risque de retour du virus depuis des zones encore infectées n'est pas nul.

Les rats laveurs peuvent également être porteurs de la rage et nous la transmettre, comme les canidés ou les chauves-souris.

La leptospirose

En Amérique du Nord, le raton laveur contribue aussi à la propagation d'une maladie bactérienne comme la leptospirose.

En Belgique, ce sont principalement les rats qui sont vecteurs de cette maladie.

La leptospirose est une infection bactérienne causée par le genre *Leptospira* et transmise des animaux à l'homme, principalement via le contact avec de l'eau, de la terre ou des aliments contaminés par l'urine d'animaux porteurs comme les rongeurs, les bovins ou les chiens. Elle peut être bénigne, se manifestant par un syndrome grippal, ou grave, entraînant des atteintes rénales et hépatiques potentiellement mortelles. La transmission interhumaine est rare.

Pas de panique pour le moment : on est loin, en Belgique, de tels fléaux. Mais il faut rester vigilant.

Que faire pour éviter la contamination ?

Ne pas toucher ou s'approcher d'un raton laveur, qu'il soit vivant ou malade ;
Éviter absolument de toucher ou de ramasser un raton laveur mort sans gants jetables étanches et masque de protection ;

Ne pas nourrir un raton laveur, même s'il a l'air inoffensif ;

Fermer les bacs à sable quand ils ne sont pas utilisés ;

Surveiller les enfants pour éviter la consommation de terre (tendance à mettre les mains en bouche) ;

Bien se laver les mains après les activités de jardinage ;

Tenir les chiens en laisse dans les milieux forestiers, les vermifuger régulièrement et ramasser leurs excréments, conformément à la loi ;

Veiller à ce que votre chien domestique ne touche pas de raton laveur vivant ou mort ;

Cueillir les baies sauvages à plus de 50 cm du sol, laver systématiquement les fruits et les légumes, cuire les aliments provenant de champs, de forêts ou de jardins potentiellement accessibles aux ratons laveurs ou aux renards.

Espèces invasives en Wallonie. Le raton laveur. Eviter ses nuisances domestiques [2023]

Environnement

Tout savoir (flyers, dépliants...)

Numérique



GRATUIT

Espèces invasives en Wallonie. Le raton laveur. Eviter ses nuisances domestiques [2023]

Ref. 122267_0

✓ En stock

Format

Papier

Numérique

Langue

Français

Allemand

↓ **TÉLÉCHARGER**
GRATUITEMENT

<https://ediwall.wallonie.be/especes-invasives-en-wallonie-le-raton-laveur-eviter-ses-nuisances-domestiques-2023-122267>

RACCOONS

<https://www.facebook.com/share/r/17DXq37Qee/>

Tv lux: le raton laveur: une menace pour
notre biodiversité

Le raton laveur (documentaire)